



PIBIC/CNPq/UFPG-2012

O PERFIL SÓCIO-EPIDEMIOLÓGICO DOS HIPERTENSOS DAS UB'S DA ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE CUITÉ- PB, BRASIL.

Vinicius Lino de Souza Neto¹, José Justino Filho²

RESUMO

Objetivo: identificar o perfil sócio epidemiológico dos hipertensos assistidos nas unidades básicas de saúde da zona urbana. **Metodologia:** O estudo é exploratório descritivo, e abordagem quantitativa, tendo como população amostral 150 hipertensos, distribuídos entre as cinco unidades básicas de saúde do município do vale do Curimataú, Paraíba - PB, neste sentido o projeto foi aprovado conforme parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE Nº 03454112.5.0000.5182. **Resultados e Discussão:** a faixa etária dos participantes variou de 66 á 75 anos (32%); houve predominância do sexo feminino 107 (71,3%); casadas (54,7%); analfabetas (50%); quanto à raça 86 (56,7%) são branca; mora com filhos (as) e esposo (70%); renda salarial está estimada em um salário mínimo 98(65,3%), o estudo aborda também a questão do vício dos pesquisados, onde 69 (46%) fazem o uso do tabaco de forma ativa, em relação à prática de atividade física, 120 (80%) não prática nenhum tipo de atividade, 89 (59,3%) vão as vezes a unidade de saúde e 60 (40%) faz o uso da medicação entre 5 á 10 anos. **Conclusão:** a população estudada, é composta em sua maioria por mulheres, brancas, com renda de um salário mínimo, fumantes e sedentárias. Observou-se ainda, que os hipertensos, não comparecem e não costuma buscar os serviços oferecidos na rede primária de atenção a saúde do município estudado.

Palavras-chave: Atenção Básica; Fatores sociais; hipertensão.

THE PROFILE OF SOCIO-EPIDEMIOLOGIC HIPERTENSIVE OF UB'S URBAN ZONE, THE MUNICIPALITY OF CUIE-PB (PB), BRAZIL.

ABSTRACT

Objective: To identify the socio demographic characteristics of hypertensive assisted in basic health units in the urban area. **Methodology:** The study is exploratory, descriptive and quantitative approach, taking as sample 150 hypertensive population, distributed among the five primary health care units of the municipality Valley Curimataú, Paraíba - PB, in this sense the project was approved by the Ethics Committee opinion Research, CAAE No. 03454112.5.0000.5182. **Results and Discussion:** The age of participants ranged from 66 to 75 years (32%), there was a predominance of females 107 (71.3%), married (54.7%), illiterate (50%); regarding race 86 (56.7%) are white; lives with children (as) and spouse (70%), wage income is estimated at a minimum wage 98 (65.3%), the study also addresses the issue of addiction of respondents, where 69 (46%) reported tobacco use actively in relation to physical activity, 120 (80%) did not practice any kind of activity, 89 (59.3%) will sometimes drive health and 60 (40%) makes the use of medication between 5 will anos. **Conclusão 10:** The study population is composed mostly of women, white, with a minimum wage income, smoking and sedentary. It was also observed that the hypertensive, do not attend and does not usually seek the services offered on the network of primary health care services from the municipality.

Keywords: Primary Care, Social factors; hypertension

¹Aluno do Curso Bacharelado em Enfermagem, Unidade Acadêmica de Saúde – UAS, UFPG, Cuité, PB, e-mail: vinolino@hotmail.com

²Sociólogo, Professor Doutor, Unidade Acadêmica de Saúde - UAS, UFPG, Cuité, PB, e-mail: josejustino@bol.com.br.