



INVESTIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CITOLÓGICO DE MULHERES EM IDADE CLIMATÉRICA

Antonio Alisancharles Batista de Almeida¹, Rosimery Cruz de Oliveira Dantas²

RESUMO

O climatério é um fenômeno endócrino que se estende dos 35 aos 65 anos da mulher, gerando modificações ginecológicas tanto anatômicas, como funcionais. Arelado a isso, o déficit imunológico também comum nesta fase, tornam a mulher propensa à vaginoses. Neste sentido a pesquisa objetiva investigar a ocorrência de afecções ginecológicas em mulheres com idade climatérica, bem como os fatores que a desencadeia e seu risco relativo. O estudo possui caráter exploratório, transversal, com abordagem quantitativa. Foi utilizada uma amostra de 330 mulheres na faixa etária de 35 a 65 anos que já tivessem realizado pelo menos três exames de papanicolau. A coleta foi efetuada nas Unidades de Saúde da Zona Urbana do município de Cajazeiras - PB, com a utilização de um questionário semi-estruturado elaborado pelo próprio pesquisador. Os resultados apontaram que 71% das mulheres apresentaram algum tipo de infecção ginecológica, que há uma relação entre a idade climatérica e o aumento da incidência de afecções ginecológicas sendo as inflamações colpocervicais as mais frequentes entre a amostra e o tratamento mais utilizado é o medicamentoso representando 41,7% do total. Conclui-se que existe uma relação estatística entre a idade climatérica e o surgimento de afecções ginecológicas, o que torna o climatério um período singular e que demandam uma atenção assistencial específica nas unidades de atenção à saúde da mulher.

Palavras-chave: Climatério, Doenças ginecológicas, Papanicolau.

INVESTIGATION OF CHANGES IN CYTOLOGICAL IN WOMEN WITH CLIMACTERIC AGE

ABSTRACT

The climacteric is an endocrine phenomenon that extends from 35 to 65 years in women, generating both gynecological anatomical changes such as functional. Coupled to this, immunological deficiency also common in this phase, women become prone to vaginosis. In this sense, the research aims to investigate the occurrence of gynecological disorders in women with climacteric age as well as the factors that triggers and their relative risk. The study is exploratory, transversal, with a quantitative approach. A sample of 330 women aged 35-65 years, had already made at least three Pap tests was used. The collection was made in the health units of the Urban Zone of the city of Cajazeiras - PB, using a semi-structured questionnaire prepared by the researcher. The results showed that 71% of women had some type of gynecological infection, there is a relationship between age and climate the increased incidence of gynecological disorders being the colpocervicais inflammation frequently between the sample and the most widely used drug treatment is representing 41.7% of the total. It concludes that there is a statistical relationship between climacteric and age the emergence of gynecological disorders, which makes a singular climacteric period and requiring a specific healthcare attention in the units of attention to women's health.

Keywords: Climateric, Gynecological diseases, Papanicolaou.

¹Aluno do Curso de Enfermagem, Unidade Acadêmica de Enfermagem, UFCEG, Cajazeiras, PB, e-mail: a.charlesdealmeida@hotmail.com

²Enfermagem, Professora Mestre, Unidade Acadêmica de Enfermagem, UFCEG, Cajazeiras, PB, e-mail: meryco_dantas@hotmail.com