



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, CLÍNICO E TERAPÊUTICO DE PACIENTES COM FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB

Nayda Babel Alves de Lima¹, Glenda Agra²

RESUMO

O déficit de pesquisas que abordam os fatores socioepidemiológicos oculta alguns fatores envolvidos no surgimento, na evolução e no tratamento das feridas. Dessa forma, este estudo objetivou traçar o perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico de pessoas com feridas agudas e crônicas no município de Cuité-PB. Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada com usuários cadastrados da Estratégia de Saúde da Família, Programa Melhor em Casa e pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora das Mercês, por meio de aplicação de um questionário semiestruturado, durante o período de outubro de 2014 a maio de 2015. Para a análise dos dados utilizou-se estatística descritiva, empregando-se o programa *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*; posteriormente os dados foram dispostos em tabelas e foram analisados à luz da literatura pertinente. Conclui-se que existe uma predominância de feridas agudas do tipo cirúrgicas em adultos jovens e predominância das feridas crônicas em mulheres idosas; observou-se também que a maioria dos participantes tinha ausência de escolaridade e renda familiar mínima, ou seja, fatores que dificultam à adesão ao tratamento correto. No que se refere à terapêutica empregada, os ácidos graxos essenciais foram os produtos mais utilizados dentre os participantes da pesquisa, com o intuito de promover a cicatrização das lesões.

Descritores: perfil epidemiológico, ferimentos penetrantes, ulcera por pressão.

ABSTRACT

The deficit of researches that approach the socio-epidemiological factors hides some factors involved in the appearing, development and treatment of wounds. Thus, this study aimed to drawing the socio-demographic, clinical and therapeutic profile of people with acute and chronic wounds in the municipality of Cuité-PB. It is a quantitative research conducted with registered users of the Family Health Strategy, Program Better in Home and patients of the City Hospital Nossa Senhora das Mercês, through implementation of a semi-structured questionnaire, during the period of October 2014 to May 2015. For data analysis there was used descriptive statistics, employing the *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*; after it the data were arranged in tables and were analyzed in the light of the relevant literature. It is concluded that there is a predominance of acute surgical-type wounds in young adults and prevalence of chronic wounds in elderly women; it was also observed that the majority of participants had the absence of schooling and minimum family income, that is, factors that hinder the adherence to proper treatment. With regard to the therapy employed, essential fatty acids were the products most used among survey respondents, in order to promote healing of injuries.

Descriptors: epidemiological profile, penetrating injuries, pressure ulcer.

¹ Aluna do Curso de Bacharelado em Enfermagem, Unidade Acadêmica de Enfermagem, UFPG, Cuité –PB. E-mail: naydababel@hotmail.com

² Professora, Mestre, Unidade Acadêmica de Enfermagem, UFPG, Cuité-PB. E-mail: g.agra@yahoo.com.br

