



**AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CONTROLE DA HANSENÍASE:
UM ESTUDO REALIZADO EM UM MUNICÍPIO HIPERENDÊMICO DO NORDESTE
BRASILEIRO**

Marcos Alan Sousa Barbosa¹, Marilena Maria de Souza²

RESUMO

A hanseníase continua sendo um problema de saúde pública no Brasil, ainda apresentando clusters de alta detecção da doença em seu território. Uma dessas áreas abrange o município de Cajazeiras-PB, que ainda apresenta índices de alta endemicidade para a doença. Logo, objetiva-se avaliar o desempenho desse município na atenção à hanseníase por meio de um instrumento de avaliação do grau de orientação dos serviços da APS na realização das ações de controle da hanseníase. Para isso, desenhou-se um estudo avaliativo executado nas unidades de saúde a partir da aplicação desse instrumento com os profissionais da enfermagem, sendo calculados escores parciais e globais de cada UBS e do município como um todo. Logo, percebeu-se que a APS local possuía graves iniquidades nos atributos “acesso” e “orientação profissional”. Os altos desvios padrões indicaram também que haviam aspectos negativos sendo mascarados dentro de atributos com alta avaliação, tais como: ausência de contrarreferência e dificuldade de encaminhamento para especialistas, pouco suporte de uma equipe de supervisão municipal, insuficiente conhecimento epidemiológico da doença no município, ausência de um ambulatório de referência na cidade. Além disso, mesmo apresentando um escore geral positivo de 7,5, o município apresentou um desvio padrão alarmante, indicando que nem todos os aspectos avaliados permaneceram acima dos valores de corte. Assim, a aplicação desse instrumento permitiu uma visão pormenorizada das competências que as unidades e a gestão municipal têm falhado, permitindo a correção desses erros e o aprimoramento da atenção ao paciente com hanseníase.

Palavras-chave: Hanseníase, Atenção Primária à Saúde, Gestão.

¹Aluno do curso de Medicina, Centro de Formação de Professores, UFCG, Cajazeiras, PB, e-mail: alanbarbosa@gmail.com

²Professora Doutora da ETSC, Centro de Formação de Professores, UFCG, Cajazeiras, PB, e-mail: marilenacarolino@uol.com.br



**ASSESSMENT OF PRIMARY ATTENTION IN THE CONTROL OF HANSENIASIS:
A STUDY CARRIED OUT IN A HYPERENDEMIC CITY IN THE NORTHEAST OF
BRAZIL**

ABSTRACT

Leprosy remains a public health problem in Brazil, still presenting high detection groups of the disease in all national territory. The city of Cajazeiras, located in the outback of Paraíba state, high endemicity rates for the disease. Along with, the main objective was evaluate the performance of the region in leprosy care, using as an evaluation tool, the degree of orientation on the services of primary health care in the health units (APS) in the implementation of leprosy control actions. It was created an evaluative study carried out in health units from the application of instruments with nursing professionals. Partial and global scores were calculated for each UBS (Basic Health Unit). With this purpose, It was found that Units had serious problems in terms of access and professional guidance. Statistics indicated that there were negative aspects being masked within highly rated attributes such as: absence of counter-referral, difficulty in referral to specialists, almost no support from a supervisory team, insufficient epidemiological knowledge of the disease in the city, absence of a referral outpatient clinic. Even with a positive overall score of 7.5, the region presented alarming data, indicating that not all aspects evaluated remained above the established values. Concerning, the application of this instrument allowed a detailed view of the competencies that the units and management have failed, allowing the correction of these errors and the improvement of leprosy patient care.

Keywords: Leprosy, Primary Health Care, Management.