



## **ANÁLISE DOS RESULTADOS DO TESTE DE PAPANICOLAU DE MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO.**

**Beatriz Pereira Alves<sup>1</sup>, Manuella Uilmann Silva da Costa Soares<sup>2</sup>**

### **RESUMO**

O Teste de Papanicolau se constitui como um exame essencial para o reconhecimento e identificação de alterações no colo do útero e infecções vaginais, e configura-se, portanto, como um dos principais aliados dos profissionais de saúde na detecção de lesões precursoras do câncer do colo uterino, principalmente em grupos de risco, tais como, as mulheres profissionais do sexo. Diante disso, esse estudo possui como objetivo, analisar os resultados do teste de Papanicolau das mulheres profissionais do sexo. Trata-se de um estudo descritivo de base documental, com abordagem quantitativa realizado no Posto de Assistência Primária à Saúde, Cajazeiras, Paraíba. Foram analisados nove resultados do Teste de Papanicolau de mulheres profissionais do sexo com idade média de 33,1 anos, idade média de início da atividade sexual de 15,5 anos e número médio de parceiros semanais de 6,57. Os epitélios representados nos resultados dos exames foram escamoso, glandular e metaplásico, e entre os achados microbiológicos se fizeram presentes tanto os da microbiota normal da vagina, quanto resultados sugestivos de infecção com presença de *Gardnerella/mobiluncus sp.* e *Trichomonas vaginalis*. Todos os exames deram negativos para neoplasia e seis deles tiveram a presença de inflamação. Dessa forma, percebe-se que todos os resultados encontrados na pesquisa foram considerados normais, ou seja, sem presença de alterações celulares significativas no colo uterino, devendo seguir a rotina de rastreamento normalmente, porém, cabe ressaltar que devido à quantidade mínima de exames, existe a impossibilidade de generalizar os resultados encontrados.

**Palavras-chave:** Profissionais do Sexo, Teste de Papanicolaou, Neoplasias do Colo do Útero.

---

<sup>1</sup>Aluna do curso de Enfermagem do Centro de Formação de professores (CFP), UFCG, Cajazeiras, PB, e-mail: pbia012@gmail.com

<sup>2</sup>Cirurgiã-dentista – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Doutora em Odontologia pela Universidade de Pernambuco, Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, UFCG, Cajazeiras, PB, e-mail: manuella1@hotmail.com



## **ANALYSIS OF PAPER TEST RESULTS OF PROFESSIONAL WOMEN OF THE SEX.**

### **ABSTRACT**

The Papanicolaou Test is an essential exam for the recognition and identification of vaginal infections and cervical changes. Furthermore, it is one of the main allies of health professionals in the detection of cervical cancer precursor lesions, mainly in risk groups, such as sex professionals women. Therefore, this study aims to analyze the results of the Pap smear test of female sex workers. This is a descriptive quantitative study based on documental analysis, carried out at the Primary Health Care Post, Cajazeiras, Paraíba. Nine results of the Pap smear test of female sex workers with an average age of 33.1 years, an average age of the beginning of sexual activity of 15.5 years and an average number of weekly partners of 6.57 were analyzed. The epithelium represented in the results of the exams were scaly, glandular and metaplastic, and among the microbiological findings, both normal vagina microbiota and suggestive results of infection with the presence of *Gardnerella / mobiluncus* sp. and *Trichomonas vaginalis* were found. All tests were negative for neoplasia and six of them had inflammation. Thus, it is clear that all of the results found in the research were considered normal, that is, without the presence of significant cellular changes in the uterine cervix, and the patients should follow a normal screening schedule, however, it should be noted that due to the minimum number of tests it is impossible to generalize the results found.

**Keywords:** Sex Workers, Papanicolaou Test, Uterine Cervical Neoplasms.