



UTILIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE TOLERÂNCIA DE FAGERSTRÖM (QTF) COMO INSTRUMENTO DE FORMULAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA NICOTÍNICA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO (HUAC).

Rodrigo Assis Machado de Araújo¹, Deborah Rose Galvão Dantas²

RESUMO

Objetivo: Traçar o perfil Epidemiológico de dependência à nicotina em pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) atendidos no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC). **Metodologia:** É um estudo observacional, analítico, transversal que utilizou questionários para captação de dados no período de agosto de 2019 a julho de 2020. **Resultados:** Durante o período do estudo, 9 pacientes foram entrevistados. O grupo é composto, predominantemente, por indivíduos do sexo feminino (88,8%), na faixa etária de 50-70 anos (55,5%), com dependência a nicotina alta ou muito alta (66,6%), de renda familiar em salários mínimos de 0 a 3 (88,8%), com grau de escolaridade de ensino médio completo (55,5%) e estado civil de casado. Foi evidenciado um tempo de tabagismo médio de 36,7 anos, com tipo de cigarro consumido sendo o industrializado (100%) e consumo médio de tabaco em maços/anos de 60,1. 66,6% dos entrevistados possuíam o pai e/ou a mãe fumantes. **Conclusão:** A análise do perfil epidemiológico de determinada população é de grande importância para a melhoria dos serviços de saúde, permitindo a obtenção de dados mais pertinentes e verossímeis a despeito do grupo abordado, sendo a epidemiologia uma importante ferramenta de impacto social permitindo a realização de intervenções focadas nas necessidades específicas apresentadas pela população estudada.

Palavras-chave: Epidemiologia; Questionário de Tolerância de Fagerström; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Dependência a nicotina.

¹Aluno do curso de Medicina do departamento UAMED, UFCG, Campina Grande, PB, e-mail: digao_grow@hotmail.com

²Professora Dra. da UAMED, UFCG, Campina Grande, PB, e-mail: deborahdantas4@hotmail.com



**USE OF THE FAGERSTRÖM TOLERANCE QUESTIONNAIRE (FTQ) AS A TOOL
FOR THE FORMULATION OF THE EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF
NICOTINICAL DEPENDENCE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE (COPD) IN THE UNIVERSITY HOSPITAL ALCIDES
CARNEIRO.**

ABSTRACT

Objective: To trace the epidemiological profile of nicotine dependence in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) treated at the University Hospital Alcides Carneiro (HUAC). **Methodology:** It is an observational, analytical, cross-sectional study that used questionnaires to collect data from August 2019 to July 2020. **Results:** During the study period, 9 patients were interviewed. The group is predominantly composed of female individuals (88.8%), in the age group of 50-70 years (55.5%), with high or very high nicotine dependence (66.6%), family income in minimum wages from 0 to 3 (88.8%), with complete high school education (55.5%) and married. An average smoking time of 36.7 years was evidenced, with the type of cigarette consumed being industrialized (100%) and average tobacco consumption in packs/years of 60.1. 66.6% of the interviewees had a smoking father and/or mother. **Conclusion:** The analysis of the epidemiological profile of a given population is of great importance for the improvement of health services, allowing the obtaining of more relevant and credible data despite the group addressed, with epidemiology being an important tool of social impact allowing the realization of interventions focused on the specific needs presented by the studied population.

Keywords: Epidemiology; Fagerström Tolerance Questionnaire; Chronic obstructive pulmonary disease; Nicotine addiction.