



PREVALÊNCIA DA ESTOMATITE PROTÉTICA EM UMA POPULAÇÃO DO SERTÃO PARAIBANO

Ederlan de Souza Nascimento¹ Cyntia Helena Pereira de Carvalho²

RESUMO

A candidíase associada à próteses dentárias removíveis são chamadas estomatite protética e é frequentemente classificada como uma candidíase eritematosa ou candidíase atrófica crônica como sinônimos. Esta condição é caracterizada por uma variedade de graus de eritema, algumas vezes acompanhado por petéquias hemorrágicas, localizadas no palato na área de contato com uma prótese removível. É uma infecção muito comum entre os pacientes portadores de prótese removível e quando tratada e acompanhada de formas incorretas, geralmente, recidivam levando a um desconforto ao paciente. O objetivo de trabalho foi identificar a prevalência da estomatite protética em pacientes atendidos na Clínica Escola de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande, bem como, caracterizar o perfil clinicopatológico e elencar os tratamentos e acompanhamentos desses pacientes. Este estudo é de caráter observacional, descritivo e transversal, onde foi feito um levantamento da prevalência através dos prontuários arquivados na Clínica Escola. A prevalência encontrada foi 1,09%, em sua maioria mulheres na faixa etária de 41 a 50 anos. A prótese total foi mais prevalente que a parcial removível e o tratamento mais preconizado foi o miconazol gel oral. Notou-se que muitos acompanhamentos não foram feitos ou escritos na ficha. Diante disto, conclui-se que a Estomatite protética teve uma baixa prevalência na população estudada, muito embora acredita-se que houve subnotificação, uma vez que muitas fichas não apresentavam o preenchimento adequado.

Palavras-chave: Estomatite Protética. Candidíase. Infecção oral.



PREVALENCE OF PROSTHETIC STOMATITIS IN A POPULATION OF THE SERTÃO PARAIBANO

ABSTRACT

Candidiasis associated with removable dentures is called denture stomatitis and is often classified as erythematous candidiasis or chronic atrophic candidiasis synonymously. This condition is characterized by a variety of degrees of erythema, sometimes accompanied by hemorrhagic petechiae, located on the palate in the area of contact with a removable denture. It is a very common infection among patients with removable prosthesis and when treated and accompanied by incorrect forms, they usually recur, leading to discomfort for the patient. The objective of this study was to identify the prevalence of denture stomatitis in patients treated at the Clinical School of Dentistry of the Federal University of Campina Grande, as well as to characterize the clinicopathological profile and list the treatments and follow-ups of these patients. This is an observational, descriptive and cross-sectional study, where a prevalence survey was carried out through the medical records filed at the Clínica Escola. The prevalence found was 1.09%, mostly women aged between 41 and 50 years. The total denture was more prevalent than the removable partial denture and the most recommended treatment was miconazole oral gel. It was noted that many follow-ups were not made or written in the form. In view of this, it is concluded that Prosthetic stomatitis had a low prevalence in the population studied, although it is believed that there was underreporting, since many forms were not adequately filled out.

Keywords: Prosthetic Stomatitis. Candidiasis. Oral infection.

**XIX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE**

